

新指定医薬部外品（15 製品群）の効能・効果の範囲（H11 医薬発 280, 283 等）

表 1-3 新指定医薬部外品(15 製品群)の効能・効果の範囲(抜粋)

製品群	剤型	効能または効果	用法・用量	代表的成分
のど清涼剤	トローチ剤 ドロップ剤	たん, のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ	通常成人 (15 歳以上) 1 日 3 回	カンゾウ キキョウ セネガ
健胃清涼剤	カプセル剤 顆粒剤 丸剤 散剤 舐剤 錠剤 内用液剤	食べ過ぎ, 飲み過ぎによる胃部不快感, はきけ (むかつき, 胃のむかつき, 二日酔・悪酔いのむかつき, 嘔気, 悪心)	通常成人 (15 歳以上) 原則 1 日 3 回 (内服液剤 1 日 1~3 回)	ウイキョウ ケイヒ ショウキョウ ニンジン ハッカ
外皮消毒剤	外用液剤 軟膏剤	すり傷, 切り傷, さし傷, かき傷, 靴ずれ, 創傷面の洗浄・消毒 手指・皮膚の洗浄・消毒	1 日数回患部に適用 (用時調製不可)	アクリノール エタノール 塩化ベンザルコニウム 過酸化水素
きず消毒保護剤	絆創膏類 外用液剤	すり傷, 切り傷, さし傷, かき傷, 靴ずれ, 創傷面の消毒・保護 (被覆)	患部に適用	アクリノール 塩化ベンザルコニウム グルコン酸 クロルヘキシジン
ひび・あかぎれ用剤 (クロルヘキシジン主剤)	軟膏剤	ひび・あかぎれ・すり傷・靴ずれ	1 日数回適量を患部に塗布	塩酸クロルヘキシジン グルコン酸 クロルヘキシジン
ひび・あかぎれ用剤		ひび・しもやけ・あかぎれ	1 日数回適量を患部に塗布	dl-カンフル 1-メントール

(メントール

塗布

ル・カンフル 主剤)				
ひび・あかぎ れ用剤 (ビタミン AE 主剤)		ひび・しもやけ・あかぎれ・手足のあれの緩和	1 日数回適 量を患部に 塗布	酢酸トコフ ェロール ビタミン A 油
あせも・ただ れ用剤	外用液 剤 軟膏剤	あせも・ただれの緩和・防止	1 日数回適 量を患部に 塗布	酸化亜鉛
うおのめ・た こ用剤	絆創膏	うおのめ・たこ	患部にはる	サリチル酸
かさつき・あ れ用剤	軟膏剤	手足のかさつき・あれの緩和	1 日数回適 量を患部に 塗布	尿素
ビタミン C 剤	カプセ ル剤	肉体疲労時，妊娠・授乳期，病中病後の体力低下時又は中高年期の ビタミン C の補給	通常成人 (15 歳以 上) 1 日 3 回限 度 (内服液剤 は 1 日 1 回)	アスコルビ ン酸 アスコルビ ン酸カルシ ウム アスコルビ ン酸ナトリ ウム
ビタミン E 剤	顆粒剤 丸剤 散剤 舐剤 錠剤 ゼリー 状ドロ ップ	中高年期のビタミン E の補給	中高年 1 日 3 回限 度 (内服液剤 は 1 日 1 回)	コハク酸 d-α-トコフ ェロール 酢酸 d-α-ト コフェロー ル d-α-トコフ ェロール
ビタミン EC 剤	内用液 剤	肉体疲労時，病中病後の体力低下時又は中高年期のビタミン EC の 補給	通常成人 (15 歳以 上) 1 日 3 回限 度 (内服液剤 は 1 日 1 回)	コハク酸 d-α-トコフ ェロール アスコルビ ン酸
ビタミン含	カプセ	滋養強壯，虚弱体質，肉体疲労・病中病後（又は病後の体力低下）・	通常成人	アミノエチ

有保健剤	ル剤 顆粒剤 丸剤 散剤 錠剤 内用液剤	食欲不振（又は胃腸障害）・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期（又は産前産後）（ビタミンA, Dを含まないもの）などの場合の栄養補給	（15歳以上） 1日3回限度 （内服液剤は1日1回）	ルスルホン酸 塩酸チアミン 塩酸ピリドキシン 塩酸フルスルチアミン リボフラビン
カルシウム剤	カプセル剤 顆粒剤 散剤 錠剤 内用液剤	妊娠授乳期・発育期・中高年期のカルシウムの補給	1日3回限度	クエン酸カルシウム グルコン酸カルシウム 沈降炭酸カルシウム 乳酸カルシウム